




カビ毒吸着剤

- ・家畜の健康を守り、生産性を高めます。
- ・各種カビ毒をバランスよく吸収
- ・高性能低価格


¥3,500.-/25kg (送料・消費税別)

FLO-BOND(フローボンド)の特徴

- ・低コスト
- ・元祖カビ毒吸着剤、25年以上に渡る研究・実験データと、世界90カ国で信用信頼の使用実績
- ・最大、自重の22%の水分を吸収、リキッドフィーディングに使用しても沈殿する事無く浮遊
- ・高品質モンモリロナイト(HSCAS)使用
- ・フローボンドとカビ毒の電荷の違いを利用して、磁石の様にカビ毒を吸着
- ・100%オーガニック、安全安心
- ・微粉末 表面積を広げる事で効率的に吸着・結合
- ・ビタミン・ミネラルを吸着する事がないためプレミックスを作る際の賦形剤として世界各国での多数使用実績



モンモリロナイト(HSCAS)の顕微鏡写真



カビ毒による症状と影響の例

カビ毒の種類	影響が予想される動物種	症状 影響
アフラトキシン B1,B2,G1,G2	コガモ・ターキー・雛・ 成鶏・子豚・仔牛・妊娠 豚・羊・人間・魚	発癌・肝機能障害・発育低下・出血性 腸炎・免疫機能低下・産肉・卵・乳性 低下
オクラトキシン	豚・鴨・鶏・人間	腎臓肝臓への影響・流産・不妊・飼料 摂取量の低下・発育低下・免疫機能低 下
デオキシリバレノール (ボミトキシン)	豚・牛・鶏・鴨・馬・人 間	豚において飼料の摂取拒否・嘔吐・下 痢・増体低下
T-2 トキシン	豚・牛・鶏・ターキー・ 馬・人間	口腔部の損傷・胃腸の激しい痛みと出 血・浮腫・生殖不能・不妊・骨髄の変 性・増体低下・発育鈍化
ゼアラレノン	豚・乳牛・ターキー・子 羊	エストロゲンによる影響（陰部浮腫・ 子宮の脱出・子宮増大）・流産・生殖 不能・不妊・発育阻害・睪丸委縮・乳 腺肥大
フモニシン	馬	白質脳軟化症・盲目よろめき症



品名 FLO-BOND(フローボンド)

原材料:モンモリロナイト(HSCAS)

使用対照:牛・豚・鶏・魚・ペット

使用方法:豚・鶏 飼料に対し0.2%(2kg/ton)添加

高濃度のカビ毒が予想される場合0.25%(2.5kg/ton)添加

牛 成牛1頭当たり60g/日を目安に給与

包装:25kg

製造元:ブルックサイド アグラ (アメリカ イリノイ州)



輸入販売元:株式会社フロンティアインターナショナル

〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五カ田2-9-1

TEL:044-980-2226 FAX:044-980-2270